



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
"CASA DE FÉLIX DE ARAÚJO"
GABINETE DO VEREADOR JOÃO DANTAS

VISTO EXP.

OF N.º 3105 *buane*

VISTO EXP.

OF N.º 3106 *buane*

REQUERIMENTO Nº <i>1036</i> /2015	Entrada na Secretaria Em: <i>21</i> / <i>07</i> /2015 <i>Sandra Melo</i>	DESPACHO Aprovado na Sessão de <i>28</i> de <i>07</i> de 2015 <i>[Signature]</i> Presidente _____ 1º Secretário _____
	Adiado para a próxima Sessão Em: / /2015 _____ Presidente	EMENTA: REQUER POR PARTE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A LEPTOSPIROSE.

Senhor Presidente,

REQUEIRO nos termos do Art. 165 do regimento interno, depois de ouvido o plenário desta sublime casa, que seja solicitado ao, **Exmo. PREFEITO DE CAMPINA GRANDE, Sr. ROMERO RODRIGUES**, para que este determine a **GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**, a realização de campanhas de combate a Leptospirose.

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma série de bactérias chamadas leptospira. A forma mais grave da doença e com mais alta mortalidade é associada ao Leptospira icterohaemorrhagiae, chamada, com mais propriedade, doença de Weil. A infecção humana na maioria das vezes está associada ao contato com água, alimentos ou solo contaminados pela urina de animais portadores do leptospira. As bactérias são ingeridas ou entram em contato com a mucosa ou pele que apresentem solução de continuidade. Os animais lembrados são os roedores, mas bovinos, equinos, suínos, cães e animais selvagens também são responsabilizados pela difusão da doença.

O tempo desde a exposição à bactéria para que a pessoa fique doente é de dois dias a quatro semanas. A leptospirose geralmente começa com febre e outros sintomas. A doença pode ocorrer em duas fases; depois da primeira fase com febre, calafrio, dor muscular, vômito ou diarreia, o paciente pode se recuperar por um tempo mas ficar doente novamente. Se ocorrer a segunda fase ela é mais severa e a pessoa pode ter meningite ou falha nos rins ou fígado. A doença dura entre alguns dias a três semanas ou mais. Sem tratamento apropriado, a recuperação pode levar vários meses.

A realização da campanha se faz ainda mais necessária, tendo em vista que já entramos no período chuvoso, portanto a probabilidade de contágio aumenta consideravelmente.

Que a decisão desta Casa seja comunicada aos referidos endereços. Vide verso.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, "Casa de Félix Araújo", em 16 de Julho de 2015.

[Signature]
JOÃO DANTAS
Vereador (PSD)



ROMERO RODRIGUES (PREFEITO)
Av. Rio Branco, 304, centro, nesta cidade

DRA. LUZIA PINTO (SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)
Av. Assis Chateaubriand, 1376, Liberdade, nesta cidade

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Av. Assis Chateaubriand, 1376, Liberdade, nesta cidade

PRES. DO SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SINDAVA
Rua Lindolfo de Albuquerque, 532, Ana Amélia, nesta cidade

VISTO EXP.

OF N.º
3107

Luiza

VISTO EXP.
OF N.º
3168

Luiza

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma espécie de bactérias chamadas leptospiras. A forma mais grave da doença é com mais alta mortalidade é associada ao leptospirose icterohemorrágica, chamada, com mais frequência, doença de Weil. A infecção humana na maioria das vezes está associada ao contato com água, alimentos ou solo contaminados pela urina de animais portadores da leptospirose. As bactérias são ingeridas ou entram em contato com a mucosa ou pele que apresentam solução de continuidade. Os animais envolvidos são os roedores, mas bovinos, equinos, cães e aves também são responsáveis pela difusão da doença.

O tempo desde a exposição à bactéria para que a pessoa fique doente é de dois dias a quatro semanas. A leptospirose geralmente começa com febre e outros sintomas. A doença pode ocorrer em duas fases; depois da primeira fase com febre, calafrio, calafrio, dor muscular, vômito ou diarreia, o paciente pode se recuperar por um tempo, mas ficar doente novamente. Se ocorrer a segunda fase ela é mais severa e a pessoa pode ter meningite ou falha nos rins ou fígado. A doença dura entre alguns dias a três semanas ou mais. Sem tratamento apropriado, a recuperação pode levar vários meses.

A realização de campanha se faz ainda mais necessária, tendo em vista que já entramos no período chuvoso, portanto a probabilidade de contágio aumenta consideravelmente.

Que a decisão desta Casa seja comunicada aos referidos endereços. Vide verso.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, "Casa de Félix Araújo", em 16 de Julho de 2012.

JOÃO DANTAS
Vereador (PSD)