



ESTADO DA PARAÍBA  
Câmara Municipal de Campina Grande  
“CASA DE FÉLIX ARAÚJO”  
GABINETE DO VEREADOR NAPOLEÃO MARACAJÁ

<u>REQUERIMENTO</u>	<u>Entrada na Secretaria</u> Em: <u>15/03/2016</u> <u>Sandra Melo</u>	<u>DESPACHO</u> Aprovado na Sessão de <u>17</u> de <u>03</u> de 2016  <u>Presidente</u> <u>1º Secretário</u>
Nº <u>144</u> /2016	Adiado para a próxima Sessão Em: / /2016	<b>EMENTA: REQUER SESSÃO ESPECIAL PARA DISCUSSÃO DOS PROBLEMAS RELACIONADOS A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS ZICA, DENGUE E CHICOGUNHA</b>

**Senhor Presidente,**

**REQUEIRO**, de acordo com o Regimento Interno no seu Art. 100, Inciso IV, depois de ouvir o Plenário desta Douta Casa, **SESSÃO ESPECIAL PARA DISCUSSÃO DOS PROBLEMAS RELACIONADOS A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS ZICA, DENGUE E CHICOGUNHA**

**JUSTIFICATIVA**

O Zika Vírus é uma infecção causada pelo vírus ZIKV, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya.

O vírus Zika teve sua primeira aparição registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da Floresta Zika, em Uganda. Entretanto, somente em 1954 os primeiros seres humanos foram contaminados, na Nigéria. O vírus Zika atingiu a Oceania em 2007 e a França no ano de 2013. O Brasil notificou os primeiros casos de Zika vírus em 2015, no Rio Grande do Norte e na Bahia.

O contágio do vírus ZIKV se dá pelo mosquito que, após picar alguém contaminado, pode transportar o ZIKV durante toda a sua vida, transmitindo a doença para uma população que não possui anticorpos contra ele.

O ciclo de transmissão ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipientes com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após este período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas. O Aedes aegypti procria em velocidade prodigiosa e o mosquito adulto vive em média 45 dias. Uma vez que o indivíduo é picado, demora no geral de 3 a 12 dias para o Zika vírus causar sintomas.

Os sinais de infecção pelo Zika vírus são parecidos com os sintomas da dengue, e começam de 3 a 12 dias após a picada do mosquito. Os sintomas de Zika Vírus são:

**Febre baixa (entre 37,8 e 38,5 graus)**

**Dor nas articulações (artralgia), mais frequentemente nas articulações das mãos e pés, com possível inchaço**

**Dor muscular (mialgia)**

**Dor de cabeça e atrás dos olhos**

**Erupções cutâneas (exantemas), acompanhadas de coceira. Podem afetar o rosto, o tronco e alcançar membros periféricos, como mãos e pés**

**Conjuntivite: um quadro de vermelhidão e inchaço nos olhos, mas em que não ocorre secreção.**

**Sintomas mais raros de infecção pelo Zika vírus incluem:**

**Dor abdominal**

**Diarreia**

**Constipação**

**Fotofobia**

**Pequenas úlceras na mucosa oral.**

*Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande “Casa de Félix Araújo”, em  
\_\_\_\_\_ de Março de 2016.*

  
NAPOLEÃO MARACAJÁ  
Vereador do PC do B